راهنمای مصرف کنسانتره شیری گوسفندی

مصرف اصولی و کنترل‌شده‌ی کنسانتره شیری گوسفندی، تأثیر زیادی بر حفظ سلامت دام و افزایش بازدهی شیر دارد.
برای دستیابی به بهترین نتایج، رعایت نکات زیر ضروری است:

✅ میزان مصرف روزانه

- **گوسفند شیرده سبک (نژاد بومی):** ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم کنسانتره در روز
- **گوسفند شیرده پُربازده یا اصلاح‌شده:** ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در روز
- میزان دقیق مصرف بسته به وزن دام، میزان تولید شیر، سن و شرایط بدنی باید توسط کارشناس تغذیه تعیین شود.

✅ نحوه توزیع در طول روز

- بهتر است کنسانتره روزانه در دو وعده (صبح و عصر) به‌صورت مخلوط با علوفه یا جداگانه مصرف شود تا از بروز مشکلات گوارشی جلوگیری شود.

✅ همراهی با علوفه مناسب

- برای گوسفندان شیرده، باید حداقل **۲ تا ۳ برابر وزن کنسانتره، علوفه باکیفیت (یونجه، شبدر، کاه) مصرف شود** تا هضم بهتر صورت گیرد و سلامت شکمبه حفظ شود.

✅ آب و نمک معدنی

- دسترسی دائم به آب تمیز و **بلوک‌های نمکی یا مکمل‌های معدنی** توصیه می‌شود تا کمبودهای تغذیه‌ای جبران شود.

✅ شروع تدریجی

- در صورت تغییر جیره یا شروع تغذیه با کنسانتره، مقدار مصرف باید به‌تدریج طی ۵ تا ۷ روز افزایش یابد تا دام به ترکیب جدید عادت کند.

✅ شرایط نگهداری کنسانتره

- کنسانتره باید در محیطی خشک، خنک و به دور از نور مستقیم آفتاب یا رطوبت نگهداری شود تا خواص تغذیه‌ای آن حفظ شود.