

عادت‌دهی دام‌های سبک به جیره‌ی جدید یکی از مهمترین مراحل پرورش است. اگر دام به‌صورت ناگهانی با حجم زیادی از کنسانتره مواجه شود، مشکلاتی مانند اسیدوز و نفخ ایجاد می‌شود. بنابراین لازم است طی یک دوره ۱۴ روزه، به‌تدریج مقدار کنسانتره افزایش و مقدار علوفه کاهش یابد تا سیستم گوارش دام به شرایط جدید عادت کند.

جدول برنامه ۱۴ روزه عادت‌دهی دام سبک

روز	علوفه (% جیره)	کنسانتره (% جیره)	توضیحات
۱	90%	10%	شروع با مقدار کم کنسانتره
۲	88%	12%	افزایش تدریجی
۳	85%	15%	مراقبت از نشخوار دام
۴	80%	20%	افزایش آهسته تا روز هفتم
۵	75%	25%	مصرف آب کافی
۶	70%	30%	دام را زیر نظر بگیرید
۷	65%	35%	نقطه میانی تغییر جیره
۸	60%	40%	کاهش تدریجی علوفه خشبی
۹	55%	45%	دام باید انرژی بیشتری دریافت کند
۱۰	50%	50%	نسبت برابر جیره

آماده‌سازی شکمبه برای مصرف بیشتر کنسانتره	55%	45%	۱۱
در بزهای حساس با احتیاط افزایش دهید	60%	40%	۱۲
نزدیک به جیره نهایی پرواری	65%	35%	۱۳
تثبیت جیره پرواری	70%	30%	۱۴

نکات کلیدی

- آب تمیز و کافی همیشه در دسترس باشد.
- افزایش خوراک باید تدریجی باشد، نه یکباره.
- تغییرات ناگهانی ممکن است به مشکلات گوارشی منجر شود.
- بهتر است کنسانتره مصرفی از ترکیب غلات، سیوس، ویتامین و مواد معدنی بالانس شده باشد.

جمع‌بندی

این برنامه‌ی ۱۴ روزه کمک می‌کند دام‌های سبک بدون مشکل به خوراک کنسانتره عادت کنند و بیشترین بازدهی را در دوره پرواربندی یا شیردهی داشته باشند. برای تهیه **کنسانتره دامی استاندارد و باکیفیت** می‌توانید به فروشگاه ما مراجعه کنید و محصولات متنوع متناسب با نیاز دام سبک خود را انتخاب کنید.